

**BULETIN DE AVERTIZARE**Nr.....57.....din.....05 SEPTEMBRIE.....2025

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere □solarii□ răsadnițe□, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

PĂDUCHELE DIN SAN JOSE,
RAPĂN (VENTURIA INEQUALIS),
FĂINARE (PODOSPHERA LEUCOTRICA),
BOLI DE DEPOZIT (GLOESPORIUM SP. , ALTERNARIA SP. , PENICILLIUM SP. , BOTRITIS SP.)

care poate cauza pierderi importante la: **MĂR, PĂR**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

PĂDUCHELE DIN SAN JOSE: ZONELE AFECTATE DE PĂDUCHE SE ÎNROȘESC ȘI SE NECROZEAZĂ DIN CAUZA UNEI SUBSTANȚE TOXICE PE CARE PADUCHELE O INJECTEAZĂ ÎN TIMP CE SE HRĂNEȘTE.

RAPĂNUL MĂRULUI : AFECTEAZĂ TOATE ORGANELE VERZI ALE PLANTEI. ATACUL SE MANIFESTĂ LA ÎNCEPUT PRIN APARIȚIA UNOR PETE MICI, CU ASPECT CATIFELAT CU DIMENSIUNI DE 0,5-6 MM DE CULOARE VERDE -MASLINIE, SAU BRUN- NEGRICIOASĂ CU UN CONTUR DIFUZ. LA ATACURI PUTERNICE PETELE POT SA CONFLUEZE

FĂINAREA : ATACĂ FRUNZELE, LĂSTARIILE TINERI, RAMURILE , FLORILE, MAI RAR FRUCTELE. SE MANIFESTA PRIN APARIȚIA UNEI PĂSLE MICELIENE ALBICIOSE - GĂLBUI.

BOLI DE DEPOZIT: PETE CIRCULARE , DIFERITE MĂRIMI, DE CULOARE BRUNĂ, CE SE MĂRESC PE MĂSURĂ CE BOALA AVANSEAZĂ. PULPA FRUCTULUI DIN ZONA AFECTATĂ SE ÎNMOAIE ȘI PUTREZEȘTE.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

PREVENIREA APARIȚIEI AGENȚILOR FITOPATOGENI

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

POLECI (DECA 2,5 EC) - 0,05-0,075 % + BELLIS - 0,8 KG/ HA

Alte recomandări:

PENTRU ACARIENI SE POATE UTILIZA PRODUSUL NISSORUN 10 WP - 0,3 KG / HA

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.