

BULETIN DE AVERTIZARENr. 19 din 20 APRILIE 2026

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere și solarii răsadnițe, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

GĂRGĂRIȚA FRUNZELOR DE PORUMB (TANYMECUS DILATICOLLIS)care poate cauza pierderi importante la cultura: **PORUMB ȘI FLOAREA SOARELUI**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

RĂȚIȘOARA PORUMBULUI : ARE O SINGURĂ GENERAȚIE PE AN ȘI IERNEAZĂ ÎN STADIUL DE ADULT, ÎN SOL, LA ADÂNCIMI DE 40 - 60 CM. DACĂ PLANTA ESTE FOARTE MICĂ, ÎN FAZA DE CUI, GÂNDACUL ROADE TULPINA ȘI VÂRFUL DE CREȘTERE. POATE ROADE FRUNZELE SAU PLANTA ÎN REGIUNEA COLETULUI. PESTE FAZA PORUMBULUI DE 3-5 FRUNZE, RĂȚIȘOARA NU MAI ESTE ATÂT DE AGRESIVĂ, DIN DOUĂ ASPECTE: CUTICULA FRUNZEI SE ÎNGROAȘĂ, NU MAI ESTE ATÂT DE FRAGEDĂ, IAR DĂUNĂTORUL NU O MAI CONSUMĂ. IAR AL DOILEA MOTIV ESTE CĂ SE RETRAGE PENTRU DEPUȘTEREA PONTEI ÎN SOL.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

**LA CONSTATAREA A 3 EXEMPLARE / M² PE TIMP SECETOS ȘI
10 EXEMPLARE/ M² PE TIMP UMED**

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

LAMDEX EXTRA (REXARIS 25 WG) = 0,3 KG/ HA

**IMPORTANT! BELEM 0,8 MG / (PICADOR 0,8 MG= 12 KG/HA OMOLOGAT PENTRU A
SE APLICA ÎN BRAZDA PRIN INCORPORARE LA SEMANAT**

Alte recomandări:

* CULTURA TREBUIE MONITORIZATĂ ZILNIC PÂNĂ LA FAZA DE 5 FRUNZE, PENTRU A VEDEA DACĂ TRATAMENTUL ȘI-A FĂCUT EFECTUL. DACĂ MAI SUNT DĂUNĂTORI VII SE RECOMANDĂ APLICAREA CELUI DE-AL DOILEA, SAU CHIAZ CELUI DE AL TREILEA TRATAMENT CU UN INSECTICID OMOLOGAT, CU ACȚIUNE SIMILARĂ, CUM AR FI DELTAGRI / (FASTER DELTA= 0,3 L/HA

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7-8;

Clatiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > *program SCAPA* www.aiprom.ro

Luăți măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* (nr. 3242/F/21.10.1016) și *Federația Asociațiilor Apicole din România - ROMAPIS* (nr 103/ 21.10.2016) , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit, BOCU MARCELA

(nume, Prenume, Semnătură)

Se aprobă, Coordonator Oficiul Fitosanitar Zonal Bacău - Neamț,

ZAHARIA GHEORGHE



Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza și avertizare

Nume și prenume fermier/soc.comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratatamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruienți	Denumire ppp folosit	Doza omologă și/doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT ! BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.