

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.....32.....din.....12.Mai.....2026

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere ☐solarii☐ răsadnițe☐, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

**ALTERNARIOZA CARTOFULUI (ALTERNARIA SOLANI),
MANA (PHYTOPHTHORA INFESTANS),
AFIDE,
GÂNDACUL DIN COLORADO (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA) -ADULȚI GI**

CARE POT CAUZA PIERDERI IMPORTANTE LA CULTURA DE CARTOF

SCURTĂ DESCRIERE A BOLII SAU DĂUNĂTORULUI:

ALTERNARIOZA CARTOFULUI: SE MANIFESTĂ MAI ÎNTÂI LA NIVELUL FRUNZELOR DE LA BAZA PLANTEI. PE FRUNZE APAR PETE BRUNE, ULTERIOR CENUȘII, MAI MULT SAU MAI PUȚIN CIRCULARE, CARE POT AVEA UN DIAMETRU DE 10 MM SAU CHIAR MAI MARE. ACESTE PETE SUNT FOARTE BINE DELIMITATE, VIZIBILE ȘI ZONATE CONCENTRIC.

MANA: ATACĂ TOATE ORGANELE PLANTEI: FRUNZE, TULPINI, INFLORESCENȚE, TUBERCULI. PE FRUNZE APAR PETE CU FORMĂ CIRCULARĂ, ÎN NUANȚE DE GALBEN-UNTDELEMNIE, CARE ÎN TIMP SE TRANSFORMĂ ÎNTR-UN FEL DE ARSURI BRUNE CU UN INEL GALBEN. PE PEȚIOLUL FRUNZELOR ȘI PE PEDUNCULI APAR PETE CU FORMĂ ALUNGITĂ, BRUN NEGRICIOASE, DE MĂRIME VARIATĂ. CÂND ACESTE PETE CUPRIND TULPINA CARTOFULUI DE JUR ÎMPREJURUL ACESTEIA, ATUNCI TULPINA SE USUCĂ ÎMPREUNĂ CU FRUNZELE.

GÂNDACUL DIN COLORADO : ADULȚII ROD FRUNZELE, PRODUCÂND GĂURI CU MARGINI NEREGULATE. AJUNGÂND UNEORI SĂ CONSUME ÎNTREAGA FRUNZĂ.

AFIDELE: ÎNȚEAPĂ ȘI SUG SUCUL CELULAR

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

TRATAMENTUL SE ÎNCEPE CU SOIURILE SENSIBILE, LA ÎNCHEIEREA RÂNDURILOR

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

BADGE WG(COPRANTOL DUO)= 3,0 KG/HA + MAVRIK 2 F (EVURE)= 0,2 L/ HA

Alte recomandări:

*** TRATAMENTUL SE REPETA DUPĂ 8-10 ZILE, CU ALTE PRODUSE OMOLOGATE PENTRU TESTELE AVERTIZATE.**

*** ÎN CAZUL AMESTECURILOR DE PRODUSE SE VA FACE OBLIGATORIU TESTUL DE COMPATIBILITATE FIZICO-CHIMICĂ.**